

RESUMEN CASO CLÍNICO

TÍTULO

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE HIPOPLASIA CONGÉNITA DE VENA CAVA

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Las malformaciones congénitas de la vena cava inferior son infrecuentes, pero predisponen a trombosis venosa profunda (TVP) iliofemoral extensa y síndrome posttrombótico (SPT) grave y, a menudo, no responden a medidas conservadoras. Se presenta un caso de hipoplasia de cava con SPT refractario y su manejo mediante tratamiento endovascular.

Presentamos el caso de un varón de 54 años con diagnóstico de TVP femoral izquierda en 2015. Consulta por edema, dolor, calambres, pesadez, induración cutánea, hiperpigmentación y eritema en ambos miembros inferiores, mayor en izquierdo, así como varicocele. Escala Villalta: 12 puntos. En tratamiento con acenocumarol, rehabilitación y medias elásticas sin mejoría clínica. Se realiza angio-tc donde se objetiva hipoplasia de vena cava

Se indicó tratamiento endovascular. Mediante flebografía y ultrasonido intravascular (IVUS), se realiza recanalización venosa e implantación de stents en vena cava inferior a nivel infrarrenal y suprarenal y venas ilíacas comunes.

La flebografía de control y IVUS confirmaron permeabilidad y correcta aposición de los stents en cava e ilíaco derecho. No se objetivó en la flebografía el contraste en eje izquierdo, pero en IVUS se descartó complicaciones y se observó abundante colateralidad por ramas iliolumbares.

A nivel clínico, la sintomatología mejoró durante el seguimiento y la puntuación de Villalta descendió a 5 puntos.

En el control ecográfico a 3 meses se objetivó permeabilidad de los stents, velocidades adecuadas y ausencia de trombo intraluminal; ejes femorales permeables.

En el control a los 6 meses con angio-tc se objetivó permeabilidad de los stents en cava e ilíacas.

COMENTARIO FINAL

La corrección endovascular de la obstrucción venosa en pacientes con hipoplasia de la vena cava constituye una alternativa válida cuando el manejo conservador no resulta efectivo. En este caso, la intervención permitió restablecer el drenaje venoso, mejorando además la clínica de forma significativa.